

Grandes cultures

Le 15 Mai 1986

n° 7

BLE : Traiter la Septoriose en Limousin
Surveiller et agir contre le Piétin-verse
avec les BMC
ORGE D'HIVER : Intervenir contre la Rhynchosporiose
COLZA : Développement de Pseudocercospora
en Limousin

BLE

Stades (2 noeuds - 7)
(Dernière feuille visible : 8
(surtout en Limousin))

MALADIES

★ Situation

* En Limousin

- . Septoriose (tritici) : 40 % des parcelles présentent des attaques sur la 3ème feuille (F3).
- . Aucune autre maladie n'est signalée.

* En Auvergne

- . Piétin-verse : Surtout présent dans l'ALLIER
(25 % des parcelles ont atteint le seuil).
Signalé très localement dans le PUY-DE-DOME (Limagne Sud) et en HAUTE-LOIRE.
La maladie a atteint la dernière gaine et arrive à la tige.
- . Septoriose (tritici) : Légère progression surtout dans l'ALLIER
30 % des parcelles présentent des attaques sur la F4 et 5 % sur la F3.

★ Préconisations

* En Limousin

Intervenir contre la Septoriose dès maintenant, dès que les premiers symptômes sont notés sur la 3ème feuille (F3). Utiliser une spécialité agissant surtout en préventif (chlorothalonil...).

* En Auvergne

Pour ceux qui utilisent un BMC contre le Piétin-verse, intervenir très rapidement. Choisir une spécialité polyvalente en même temps efficace sur la Septoriose.

Pour le choix des spécialités, consulter le dépliant vert joint dans le bulletin précédent.

P.140

ORGE D'HIVER

- 2 -

Stades (1 noeud : 6
) 2 noeuds : 7

MALADIES

★ Situation

- * En Limousin : - Forte progression de la Rhynchosporiose
 - Absence d'autres maladies.
- * En Auvergne : - Développement de la Rhynchosporiose dans de nombreuses parcelles.
 - Plus fortes attaques dans l'ALLIER.
 - L'Helminthosporiose teres est quasi absente.

★ Préconisation

Intervenir rapidement si la maladie évolue sur la F3.
Consulter le dépliant vert pour le choix du fongicide.

COLZA

Stades (Floraison - F2
) Chute des premiers pétales - G1

CHARANÇON DES SILIQUES

★ Situation

Captures depuis la première semaine de mai dans quelques postes du Limousin, de l'Allier et du Puy-de-Dôme.

★ Préconisation

Le Colza est sensible jusqu'au stade G4 (10 premières siliques bosselées).

Seuil d'intervention : 1 insecte par plante.

- . *Si risque cécidomyies : dès que 20 % des plantes sont porteuses de charançons.*

Utiliser un insecticide non dangereux pour les abeilles.
Dès la chute des pétales, la rémanence des insecticides est très courte.

PSEUDOCERCOSPORELLA

(Maladies des taches blanches)

★ Situation

Développement en Limousin avec passage sur les feuilles intermédiaires voire supérieures surtout sur la variété DARMOR.

★ Préconisation

En cas de présence, intervenir rapidement en utilisant une association à base de BMC (bénomyl : 250 g m.a., carbendazime : 250 g m.a., méthylthiophanate : 750 g m.a.) ou SPORTAK PF à 1,5 l/ha.

SCLEROTINIA - CYLINDROSPORIOSE

Progression de la cylindrosporiose dans l'ALLIER.
Intervenir très rapidement selon nos préconisations de notre dernier bulletin.

MAIS

Conserver le dépliant joint.

